

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ hè thu năm 2024

Hiện nay các trà lúa trên địa bàn toàn xã đang trong giai đoạn từ phân hóa đòng đến Ôm đòng, nhìn chung lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến các trà lúa trở như sau:

+, Trà 1: trở tập trung từ 25/7 đến 02/8/2024 có khoảng 25 ha Ân Quang, Đồng Eo Tân Trung

+, Trà 2: Trở tập trung từ 03/8 – 10/8/2024 diện tích khoảng 90 ha gồm các xóm Khánh Thành, Tiên Sơn, Rạng Đông, Hậu Thành, Châu Thành, Tân Trung

+, Trà 3: trở tập trung từ 11/8 – 20/8/2024 diện tích còn lại tập trung xóm Đồng Kén và 1 số vùng thiếu nước của các xóm gieo cấy muộn sau

Để chủ động phòng trừ có hiệu quả, đảm bảo cho năng suất lúa hè thu đạt kết quả cao, UBND xã yêu cầu BCH các xóm và bà con nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ban chỉ huy các xóm phối hợp với ban nông nghiệp xã thường xuyên kiểm tra phân trà và xác định thời gian trở của các trà lúa.

+, Hiện nay, bệnh khô vằn hại lúa xuất hiện với tỷ lệ hại phổ biến từ 5 – 7%, nơi cao từ 10 – 15 %. Ban chỉ huy các xóm hướng dẫn nông dân phun bệnh khô vằn hại lúa đối với diện tích có 10% số danh bị bệnh bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Validacin 3-5L, Vida 5WP kết hợp phun phòng bệnh lem lép hạt: Tilt super 300ND, Nativo 750 WG..... phun theo liều lượng khuyến cáo.

+, Thời điểm phun phòng bệnh lem lép hạt: Phun khi lúa bắt đầu trở 1 – 3% và phun lại lần 2 khi lúa đã trở hoàn toàn. Khi phun cần chú ý đảm bảo đủ lượng nước thuốc tối thiểu 24 lít/sào và phun vào chiều tối hoặc sáng sớm. Đối với bệnh đen lem lép hạt bà con nhân dân chú ý theo dõi điều kiện thời tiết từ giai đoạn cây lúa từ khi ôm đòng đến trở bông nếu gặp điều kiện thời tiết bất thuận như nhiệt độ không khí cao, mưa phùn kéo dài... thì tiến hành phun phòng kịp thời.

+, Rầy nâu, rầy lưng trắng xuất hiện phổ biến với mật độ từ 100 – 200 con/m² nơi cao từ 100 – 300 con/m², cục bộ có ổ rầy 500-1000 con/m² tập trung tại các cánh đồng Cây Trai, Hố Ông Cầu xóm Trung Phong Cũ (Để tránh hiện tượng cháy rầy vào cuối vụ yêu cầu bà con thường xuyên kiểm tra thăm đồng nếu phát hiện mật độ rầy từ 1500 con/m² trở lên thì phun trừ bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Chess 50WG,, Oshin 20WP.....

+, Bọ Xít hại lúa: Bọ xít thường gây hại nặng vào giai đoạn khi cây lúa bắt đầu trở đến ngậm sữa và tỏa ra mùi khó chịu vào chiều tối, đặc biệt bọ xít gây hại nặng ở các khu vực nhiều cỏ dại, gần rừng, các ruộng bỏ hoang,... đặc biệt năm nay do đầu vụ thời tiết nắng nóng khô hạn thiếu nước nên một số xóm gieo cấy muộn hơn tạo điều kiện cho bọ xít phát sinh phát triển gây hại trên lúa Hè Thu năm 2024, do đó các xóm cần tăng cường công tác tuyên truyền để bà con nhân dân được biết để thường xuyên kiểm tra ruộng của gia đình mình phát hiện và phòng trừ kịp thời khi có mật độ 6 con/m² thì tiến hành sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ như: Ofatox 400EC, Watox 400 EC, Fastac5 EC,.. phun theo nguyên tắc 4 đúng.

+ Hiện nay nhện gié hại gây hại cục bộ trên các xứ đồng trong toàn xã, đặc biệt là khu vực đồng Cây Dung, Xã Giới xóm Hậu Thành, đồng Phần Nhất, Bờ Sào xóm Châu Thành, đồng Sậy, đồng Hoa Thành xóm Ân Quang,..... Yêu cầu bà con nông dân kiểm tra ruộng nhà mình nếu thấy triệu chứng lúa vàng, thân tím, vết bệnh hình chữ nhật thì tiến hành phun trừ khi có số dân bị hại từ 5 – 7% bằng một trong các loại thuốc như Voliam targo; Kinalux 25 EC, comute 75 EC (Phun hiệu quả ở giai đoạn từ làm đòng đến ôm đòng). Đối với nhện gié hại lúa nếu không phòng trừ kịp thời sẽ dẫn đến hiện tượng lúa trổ không thoát hạt lúa bị biến dạng méo mó, lép lửng nhiều, màu nâu đen lốm đốm hoặc thâm đen đều trên cả hạt.

Nhận được thông báo này yêu cầu truyền thanh xã, ban chỉ huy các xóm thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh để nhân dân biết và thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã
- UBND Xã; (B/c)
- BCH các xóm; (Th/b)
- Truyền thanh xã; (Th/b)
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thái Văn Cẩm